



Link do produktu: <https://zwierzomarket.pl/aurum-0-preparat-profilaktyczny-do-higieny-ucha-psow-i-kotow-200ml-p-29117.html>



AURUM 0 - preparat profilaktyczny do higieny ucha psów i kotów 200ml

Cena brutto	42,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	34,15 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	10960
------------------	--------------

Producent	AURUM
-----------	--------------

Opis produktu

AURUM 0

preparat profilaktyczny do higieny ucha psów i kotów

Skład:

Mieszanina swoistych oksyetylenowych związków powierzchniowo czynnych, glikolu propylenowego w neutralnym, niedrażniącym, specyficznym dla uszu podłożu, o silnych właściwościach czyszczących i odtłuszczających oraz soli sodowej sulfobursztynianu dioktylu i laurylosiarczanu sodu oraz chlorheksydyny.

Przeznaczenie i sposób stosowania:

Preparat przeznaczony jest do czyszczenia zdrowego ucha psów i kotów. W przypadku rozpoczynania higieny uszu u zwierząt z zaniedbanym kanałem słuchowym, mycie należy prowadzić przez 7 dni codziennie. Po uzyskaniu zadowalającej czystości, czynność należy powtarzać nie częściej niż raz w tygodniu. Należy wypełnić całkowicie kanał słuchowy roztworem; uchwycić elastyczne części kanału słuchowego za pomocą kciuka oraz palców środkowego i serdecznego, a następnie, wielokrotnie uciskając, masować ku górze w kierunku brzuszno-grzbietowym. W ten sposób płyn jest przesuwany w górę i w dół, a luźne części wydzieliny wypłukiwane w kierunku małżowiny usznej.

Intensywność masażu zależy od nasilenia bólu spowodowanego stanem zapalnym ucha. Jednoczesny masaż kanału słuchowego zwiększa, zwłaszcza u kotów, akceptację mycia uszu. W celu dokładniejszego wyczyszczenia, kanał słuchowy po czyszczeniu Aurum 0 powinien być wypłukany płynem Aurum 2, Aurum 3 lub Aurum 4 w zależności od potrzeby.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

UWAGA:

Nie stosować w przypadku uczulenia psa na którykolwiek ze składników. Zaprześcić stosowania w przypadku pojawienia się oznak uczulenia.

Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej.